

Tableau 3 : Bilan et suivi de la NAH-TTR

	Explorations	NAH symptomatique			NAH asymptomatique	
		Initial	/ 6 mois	/ an	Initial	Suivi
	Poids, Indice de Masse Corporel	✓	✓	✗	✓	✓
Évaluation neurologique	Questionnaires : CADT, SFN-SIQ	✓	✓	✗	✓	✓
	Ex clinique : NIS, étude sensitive chaud-froid, Hypotension, Jamar	✓	✓	✗	✓	✓
	Score fonctionnel : Stade PND/FAP	✓	✓	✗	✓	✓
Électrophysiologie	ENMG, Variabilité R-R, Sudoscan®	✓	✗	✓	✓	✓
Évaluation cardiologique	NYHA, ECG, BNP, troponine	✓	✓	✗	✓	✓
	ETT +/- Holter ECG	✓	✗	✓	✓	✓
Explorations complexes	IRM cardiaque, scintigraphie DPD, MIBG, test atropine	En centre de référence, au cas par cas				
Évaluation néphrologique	DFG, microalbuminurie, protéinurie	✓	✓	✗	✓	✓
Consultation ophtalmologique	Acuité visuelle, LAF, TO, FO	✓	✗	✓	✓	✓
Suivi thérapeutique	Pace Maker	Si appareillé, tous les 6 mois				
	Traitement pharmacologique	Bio / 6 mois, neuro / 6 mois (tolérance et efficacité)				
	Consultation hépatologie si TH	Rapprochée pendant 5 ans / Tous les ans au delà de 5 ans				
	Ponction Biopsie Hépatique si TH	À 1, 2 et 5 ans				
Selon points d'appel clinique :	Gastroentérologie, urologie, néphrologie,...					